

Használati útmutatások:

- Csak olyan csalétek-állomásokban helyezze el, amelyek védve vannak a véletlen felnyitással szemben, és olyan helyeken, ahol a rágcsálók jelenlétét észlelték: búvóhelyeik/lyukaik közelében, a táplálkozási és szaporodási térségeikben, valamint a rágcsálók vonulási útvonalain.
- Házi egér: 60g/etetőállomás házi egér irtásakor.
- Barna patkány: 100g/etetőállomás patkányok irtásakor.
- A csalétek-állomásokat ellenőrizni kell: egerek esetében 2-3 naponta, patkányok esetében: 5-7 naponta a kezelés megkezdését követően és azután legalább hetente, ellenőrizve, hogy a csalétket elfogadták, a csalétek-állomások sértetlenek, valamint az elpusztult rágcsálók elpusztításának céljából.
- A csalétket töltsse újra amennyiben szükséges. Mielőtt a terméket használná, vegye fontolóra a rágcsálók jelenlétének korlátozására szolgáló, vegyi anyagot nem igénylő módszerek alkalmazását.
- A rágcsálók igen bizalmatlan állatok és kiváló a szaglásuk. Ezért a termék kezelésekor használt tárolók és kesztyűk szagmentesek kell, hogy legyenek. Továbbá, a csalétek-állomások környékéről el kell távolítani minden olyan táplálékot, amely vonzza a rágcsálókat.
- A termék kihelyezése előtt közvetlenül ne tisztítsa meg azt a térséget, ahol a rágcsálók jelenlétét észlelték, mert ez megzavarhatja az állatokat és elriaszthatja őket a csalétek elfogyasztásától.
- Amikor a terméket épületek körül alkalmazza, olyan pontokon helyezze el, ahol nem fenyegeti vízzel való elöntés. A csalétek-állomásokat kísérje figyelemmel, és ha víz érte és károsította a csalétket, cserélje ki.
- A csalétket ne vegye ki a tasakból. Ha több csalétek-állomás használatára van szükség, ezeket egymástól legalább 10m távolságban kell elhelyezni, ha enyhe fokú rágcsálójelenlét tapasztalható, és legalább 5m távolságban, ha rágcsálókkal való súlyos fertőzöttséget kell megszüntetni.
- Amennyiben lehetséges, a csalétek-állomásokat rögzítsék a talajhoz vagy más felületekhez/tárgyakhoz.
- A csalétek kihelyezését követően intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy fokozódjon a méreg fogyasztása és csökkenjen a rágcsálók újbóli elszaporodásának valószínűsége (a nyílások, lyukak eltömése, táplálékok és italok eltávolítása).