Az óvszer használata-Figyelmesen olvassa!

Minden közösüléskor használjon Pepino óvszert. Használat előtt és után vízzel mossa meg a kezét és a hímvesszőt.

- A fóliát tépje szét, majd óvatosan vegye ki az óvszert a csomagolásból, úgy, hogy azt valamilyen ékszer vagy köröm nehogy kiszakítsa (1. kép).

Ne használja az óvszert, ha az ragad, repedezett vagy sérült. Lejárt szavatosságú óvszert ne használjon.

- Az óvszer spermazsákját szorítsa össze a hüvelyk és mutató ujjával úgy, hogy a levegő kiszoruljon (2. kép)
- A másik kezével tekerje le az óvszer hátralévő részét a hímvessző tövéig (3. kép). Óvatos legyen, nehogy a körmével vagy a gyűrűvel megsértse az óvszert.
- A magömlést követően húzza ki a hímvesszőt a hüvelyből az óvszert rajta tartva (4. kép).
- A használt óvszert csak azután távolítsa el, ha a hímvessző távol van a hüvelytől és zsebkendőbe csomagolva dobja el a szemétbe, de soha ne a WC-be (5. kép)
- Az óvszerhez csak ajánlott vizes alapanyagú (pl. glicerin) síkosítót használjon. Ne használjon olaj alapanyagú síkosítót, pl. vazelin, testápoló olaj, bébi olaj stb., mivel ezek az anyagok károsíthatják az óvszer hatékonyságát.
- semmilyen fogamzásgátló eljárás nem biztosít 100%-os védelmet a terhesség, HIV vagy más szexuális fertőző betegség ellen.

Az óvszert tartsa száraz helyen és óvja a közvetlen napfénytől. Amennyiben használat közben az óvszeren szivárgást vagy sérülést talál, kérjük minél hamarabb, legkésőbb 72 órán belül forduljon orvoshoz. Minden óvszer csak egyszer használatos. Az óvszer többszöri használata fertőzésveszélyt, allergiás reakciót válthat ki, elveszíti síkosító hatását, megnő a teherbeesés és a szexuális úton terjedő betegségek kockázata.

Figyelem! A termék természetes latex anyagból készült és az arra érzékeny személyeknél allergiás reakciót ill. anafilaxiás sokkot válthat ki. Amennyiben ön allergiás a latex termékekre, kérjük az óvszer használata előtt forduljon orvosához.

Egyes hímvesszőn vagy hüvelyen alkalmazott gyógyszer befolyásolja az óvszer hatékonyságát, ezért tanácsért forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ha olyan érzése van, hogy az óvszer laza vagy megnyúlt szakítsa meg a szexuális aktust, ellenőrizze az óvszert, hogy megelőzze a szakadás lehetőségét.

Védje a közvetlen napfénytől.

