

Alkalmazási területe:

- Gyomorégés, émelygés, hányinger, puffadás, teltségérzet, és tompa gyomortáji nyomás esetén 1-2 dl-t.
 - Savtúltengéses gyomorhurut, savtúltengéssel járó gyomorbetegségek és gyomorfekély gyógyítására étkezés előtt 1 órával 1 dl-t, naponta kétszer kortyonként.
 - Elhúzódó gyomorhurutban forró tejjel, vagy langyos vízzel hígítva naponta 2 dl-t, ivókúrában.
 - Csalánkiütésnél ivókúra formájában napi 1-2 dl-t kell fogyasztani.
 - Szúnyog- és rovarcsípéseket külsőleg bekenetve igen előnyös hatású.
 - Légúti betegségeknél inhaláló vagy párologtató készülékkel használható.
- Ivókúra: Gyomorégésre rendkívül kedvező hatással bír. Túlzott savtermelés okozta panaszokra, gyomorfekély és gyomorhurut kezelésére, cukorbetegség bizonyos eseteiben a vércukorszint csökkentésére, étkezés közben fogyasztva az emésztést segíti.
- Kúraszerű fogyasztása javasolt.
- Az időtartama 4-6 hét, napi adagja legfeljebb 2dl.
- Belélegzőkúra: Ventilációs párologtatóval, ultrahangos porlasztókészülékkel (pl.: BONECO), vagy szaunavízként alkalmazva.
- Légutak hurutos megbetegedéseinek kezelésére, nyákoldásra, rekedtség esetén a hangszálak regenerálására. Asthma bronchiale, Croup - szindróma, dohányzás okozta panaszok ellen.
- Nem használható:
- Coli fertőzés, veseműködés zavarai, savhiány esetén.